



XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia  
21 a 26 de novembro de 2004  
Universidade Regional de Blumenau/SC

## **MAPEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA (*AMAZONA BRASILIENSIS*) NO ESTADO DE SÃO PAULO - SUBSÍDEOS PARA DETERMINAR AS ÁREAS DE MAIOR AMEAÇA E LOCALIDADES PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DESTA ESPÉCIE NO ESTADO.**

Mauro Galetti<sup>1,2</sup>, Fabio Schunck<sup>2</sup>, Marcelo Ribeiro<sup>2</sup>, Antônio Adão Paiva<sup>2</sup>, Renato Toledo<sup>3</sup>, Leandro Mineiro<sup>3</sup>

1 - Laboratório de Biologia da Conservação, Departamento de Ecologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), CP 199, 13506-900 Rio Claro, SP, Brazil. mgaletti@rc.unesp.br

2 - Instituto de Biologia da Conservação (IBC), Av. P-13, 293, Vila Paulista, Rio Claro, SP, Brazil.

O papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) apresenta uma ocorrência natural restrita a encosta leste da Serra do Mar, principalmente nas terras baixas e ilhas existentes na faixa litorânea, que começa no sul do estado de São Paulo, passa pelo Paraná e termina na região norte de Santa Catarina. Este projeto teve como principal objetivo fazer o mapeamento e distribuição desta espécie no Estado de São Paulo, proporcionando assim a localização das áreas de maior ameaça e localidades prioritárias para conservação. Os trabalhos de campo foram realizados entre os meses de maio de 2003 e maio de 2004. Foram feitas 7 saídas mensais de 10 dias cada, totalizando 358 horas de trabalho de campo. Durante estas etapas, foram percorridas 69 localidades no total de 179 visitas. Os trabalhos foram realizados na região da Ilha de Cananéia, Ilha do Cardoso, Ilha Comprida, Iguape e Pariquera-açú. As análises dos dados foram feitas utilizando-se programas de SIG - Sistema de Informação Geográfica. Foi constatada a ocorrência deste papagaio em 54 dos 69 pontos visitados durante os trabalhos de campo. Foram observados desde grupos pequenos como grupos médios e grandes. Os principais dormitórios estão localizados em Cananéia (3 na Ilha e 2 no continente), na Ilha do Cardoso (3), na Ilha Comprida (2) e em Pariquera-açú (1). Foram definidas como áreas prioritárias para conservação deste papagaio à região da Ilha de Cananéia e Ilha Comprida. Estas regiões estão sofrendo um aumento populacional considerável nos últimos anos e com isso, estão aparecendo diversos problemas ambientais que ameaçam diretamente os grupos de papagaios existentes na região. Em Cananéia, podemos citar como principal ameaça aos 2 dormitórios localizados no entorno da cidade, o crescimento desordenado de bairros como o Acaraú e Carijo. Nestas áreas, diversas famílias estão destruindo a vegetação nativa para construir casas e fazer plantações. Estas ações estão sendo facilitadas por políticos da região. Citamos também a região do Brocuãinha, que está prestes a se transformar num condomínio particular. Caso isso seja feito, será destruído um dormitório e uma área de alimentação onde já foram observados 350 papagaios. A área nativa do entorno da cidade é fundamental para preservação desta ave e precisa ser conservada.

Palavras chave: *Amazona brasiliensis*, Cananéia, Ilha do Cardoso. Órgãos Financiadores: Fundación Loro Parque e Chester Zôo.