



XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia
21 a 26 de novembro de 2004
Universidade Regional de Blumenau/SC

ESTIMATIVA POPULACIONAL DO PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA (*AMAZONA BRASILIENSIS*) PARA AS ILHAS DE CANANÉIA, ILHA COMPRIDA E ILHA DO CARDOSO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP.

Mauro Galetti^{1,2}, Fabio Schunck², Marcelo Ribeiro², Antônio Adão Paiva², Renato Toledo², Leandro Mineiro²

1- Laboratório de Biologia da Conservação, Departamento de Ecologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), CP 199, 13506-900 Rio Claro, SP, Brazil. mgaletti@rc.unesp.br

2- Instituto de Biologia da Conservação (IBC), Av. P-13, 293, Vila Paulista, Rio Claro, SP, Brazil.

O Papagaio-de-cara-roxa (*Amazona brasiliensis*) ocorre desde o litoral sul do estado de São Paulo até o litoral norte de Santa Catarina. Sua população atual é de aproximadamente 3.600 indivíduos sendo que aproximadamente 1550 papagaios constituem a população do Estado de São Paulo. O Objetivo deste trabalho foi conhecer a população atual desta espécie na a Ilha de Cananéia, Ilha do Cardoso e Ilha Comprida, sua principal área de ocorrência dentro do Estado. Foram realizadas duas contagens, uma como projeto piloto em Julho de 2003 e a outra oficial em Junho de 2004. Participaram de cada contagem, aproximadamente 20 pesquisadores. Todos observadores foram colocados em pontos estratégicos de observação, geralmente localizados no entorno dos dormitórios ou em áreas de deslocamento dos papagaios entre as Ilhas. As amostragens foram realizadas simultaneamente em 9 pontos. Foram realizadas 4 contagens por atividade, sendo 2 no período da manhã (entre 6:00 e 8:30hs) e 2 no período da tarde (entre 16:00hs e 18:30hs). No final de cada período de observação, os observadores eram reunidos com o objetivo de comparar os dados, eliminando assim, os possíveis papagaios recontados. A contagem de 2003 registrou 278 papagaios e a contagem de 2004 registrou 1221 papagaios para estas três ilhas. A primeira contagem serviu como projeto piloto, e a segunda amostragem, além de contar com mais pesquisadores, cobriu somente as localidades significativas de ocorrência desta espécie na região. O censo de 2004 registrou 445 papagaios para o Cardoso, 384 para a Ilha comprida e 392 para Cananéia. Como estas contagens foram realizadas simultaneamente em pontos estratégicos, podemos dizer com total segurança que a população atual do Papagaio-de-cara-roxa na sua principal região de ocorrência no estado de São Paulo é de 1221 indivíduos, ou seja, 78,7 % da população total descrita pelo único trabalho de censo realizado no estado em 1995. Estes dados comprovam definitivamente que esta região onde estão localizadas as Ilhas de Cananéia, Ilha do Cardoso e Ilha Comprida são prioritárias para conservação desta espécie de papagaio tão ameaçada a nível regional e nacional.

Palavras chave: *Amazona brasiliensis*, Cananéia, Ilha do Cardoso.

Órgãos Financiadores: Fundación Loro Parque e Chester Zôo.