



XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia  
21 a 26 de novembro de 2004  
Universidade Regional de Blumenau/SC

## REAPARECIMENTO DO TUIUIÚ *JABIRU MYCTERIA* (CICONIDAE) NA CIDADE DE SÃO PAULO APÓS 110 ANOS SEM REGISTROS

Fabio Schunck<sup>1</sup> e Ubiratan Ghetti

1 - Estagiário da seção de aves do Museu de Zoologia da USP (fabio\_schunck@yahoo.com.br)

Considerado a maior cegonha do mundo, o tuiuiú (*Jabiru mycteria*) ocorre da América Central ao norte da Argentina. No Brasil a espécie já foi registrada na Amazônia nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior população desta espécie é encontrada no Pantanal. No estado de São Paulo as populações de tuiuiú são encontradas na região do Pontal, ao longo do rio Paraná. Na cidade de São Paulo o único registro documentado desta ave (uma pele) foi feito em 1893 pelo naturalista Hermann von Ihering. O desaparecimento desta espécie dos arredores de São Paulo pode ter sido provocado pelo crescimento acelerado da cidade e redução drástica das áreas naturais alagadas, existentes anteriormente ao longo dos rios e riachos que, na época, circundavam a cidade. Depois de 110 anos sem registros e considerada extinta localmente, 2 tuiuiús, foram observados no final de 2003 e início de 2004 na represa do Guarapiranga, localizada na zona sul da cidade (23°44'00.2" 46 °43'53.6"). A região onde as aves foram encontradas fica totalmente isolada da parte urbana da represa. Durante o período de estiagem, que aconteceu entre outubro de 2003 e janeiro de 2004, os níveis hídricos do reservatório ficaram abaixo da média anual e estas áreas se transformaram em verdadeiros “pântanos” formados pela grande quantidade de macrófitas e bancos de sedimento. Estas características, juntamente com a oferta de alimento existente na represa, podem ter sido importantes na escolha desta área pelas aves, pois as mesmas permaneceram no local durante 15 dias. Os tuiuiús alimentaram-se de pequenos peixes, invertebrados e principalmente caramujos do gênero *Pomacea*, abundantes na região. Depois deste período as aves não foram mais observadas na represa. Este registro é importante e sugere que esta e outras localidades alagadas dos arredores de São Paulo podem ter sido importantes como áreas de descanso durante os deslocamentos sazonais que estas aves realizam, e que precisam ser conservadas adequadamente. Este registro faz parte das pesquisas realizadas nesta região pelo autor (1) durante os últimos cinco anos.

Palavras chaves: *Jabiru mycteria*, Guarapiranga, São Paulo.