

70. REGISTROS DO TAUATÓ-PINTADO *ACCIPITER POLIOGASTER* (TEMMINCK, 1824, FALCONIFORMES: ACCIPITRIDAE) PARA O ESTADO DE SÃO PAULO¹

Carlos Candia-Gallardo², Paulo de Tarso Zuquim Antas³, Fabio Schunck⁴, Giulyana Althmann Benedicto⁴,

²LePAC, Dep. de Ecologia, IB, USP, São Paulo-SP, E-mail: floresta@gmail.com ³Fundação Pró-Natureza-FUNATURA, Brasília-DF ⁴Lab. de Ornitologia, Dep. de Zoologia, IB, USP, São Paulo-SP.

O tauató-pintado *Accipiter poliogaster* é o maior representante do gênero. Suas diferenças de plumagem por classe etária são tão significativas que até 1961 o juvenil foi tratado como espécie independente (*Accipiter pectoralis*). Apresenta ampla ocorrência geográfica, englobando quase toda a América do Sul. A distribuição no Estado de São Paulo ainda necessita de maior detalhamento. Registros documentados (peles) indicam a ocorrência em Iperó-Ipanema (localidade tipo), Pirajuí e Santo Amaro (registro duvidoso). Registros visuais mais recentes ampliam a área de ocorrência para a E.E. Juréia-Itatins, Itaboa-Ribeirão Branco, São Bernardo do Campo, Intervales, Ribeirão Grande e Itanhaém. No dia 14 de novembro de 2005, durante trabalho de monitoramento de aves efetuado pela Fundação Pró-Natureza nas áreas da Cia. Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A, esse gavião foi registrado em fragmento de Mata Atlântica submontana com boa estrutura de copas e em estágio avançado de regeneração (caracterizado conforme a resolução nº 1 de 31/01/1994 do CONAMA). Situado no município de São José dos Campos (23° 00'S 46° 00' W), o fragmento possui uma área de cerca de 400ha e está entre 650 e 800m de altitude, nas encostas da Serra da Mantiqueira. Durante cerca de cinco minutos foi observado um indivíduo adulto pousado em uma árvore emergente, na orla de uma estrada que corta o fragmento. Os registros recentes no Estado de São Paulo concentram-se na região leste, onde estão localizados os melhores remanescentes de Mata Atlântica, incluindo aí as áreas atualmente protegidas pelos Parques Estaduais da Serra do Mar, Intervales e Carlos Botelho. *Accipiter poliogaster* ocorre em diversas formações florestais em sua ampla distribuição geográfica e os seus requerimentos de habitat ainda não são suficientemente conhecidos. Como outras espécies do gênero, não é facilmente detectada na natureza, talvez por isso seja considerada rara. As observações recentes (1995, 2003, 2005 e 2006) indicam a necessidade da alteração de seu status de “provavelmente extinta”, como está relacionada atualmente na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção, para “em perigo” ou “vulnerável”.

Palavras-chave: *Accipiter poliogaster*, tauató-pintado, Estado de São Paulo.

1. Órgão financiador: Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A.